完全成熟时，就被人们割掉（割草）、铲掉（铲草），因而其繁殖速度也受到人为破坏的限制了。就是这样它的数量仍在增加，面积也在不断扩大。作者还特别注意到了它与原变种之间均未出现中间类型，足见它们的性状是十分稳定并能遗传的。在多年的定点观察中作者还分析、统计了这一变异种的其它性状特征，并将这些特征同它的原变种相比较，结果发现它们虽然在一些性状上有差异，但这些差异在腊叶标本上就不那么明显了，不足以作为其区别证据。

此外，作者还在其它地点也发现了这一新变异类群，同样也是数量不多，面积也不算大。

银莲花属一新变种

徐　耀　良

A NEW VARIETY OF ANEMONE

Xu Yao-liang

〔**摘要**〕 本文发表了银莲花属一新变种，即龙王山银莲花 *Anemone raddeana* Regel var. *lacerata* Y. L. Xu, var. nov.

关键词 银莲花属；龙王山银莲花

Key words *Anemone*; *A. raddeana* Regel var. *lacerata*

龙王山银莲花 新变种

Anemone raddeana Regel var. **lacerata** Y. L. Xu, var. nov.

A. var. *raddeana* differt foliis basalibus tenuioribus; segmentis magis divisis, lobulis plurimis; petiolis et petiolulis dense piliferis.

Zhejiang: Anji, Longwangshan, alt. 950m, in mixed forest, 4, April, 1991, Xu Yao-liang 0879, (**Typus!** ZJM); idem, alt. 550m, Xu Yao-liang 0888, ZJM.

本变种与原变种区别为：基生叶质地较薄；小叶的全裂片分裂程度大，小裂片的数目较多；叶柄及小叶柄上的毛较密。

浙江：安吉县，龙王山，海拔 950 m，阔叶林下，1991 年 4 月 4 日，徐耀良 0879，（模式标本，存浙江自然博物馆标本室）；同地，海拔 550m，徐耀良 0888，浙江自然博物馆。

本文作者工作单位：杭州，浙江自然博物馆。本文承蒙王文采教授及韦直研究员指导，谨此致谢。

Zhejiang Museum of Natural History, Hangzhou 310012).

1992年 1 月收到本文.